



- Laubwald und Kleingehölze
  - AD0 Birkenwald
  - zAE1a Weidenmischwald mit einh. Laubbaumarten
  - zAE2 Weiden-Auenwald
  - AM2 Bachbegleitender Eschenwald
  - BB0 Gebüsch, Strauchgruppe
  - BB1 Gebüschstreifen, Strauchreihe
  - BB4 Weiden-Auengebüsch
  - BD3 Gehölzstreifen
  - BG1 Kopfbäumreihe
- Nadelwald
  - AJ1 Fichtenmischwald mit einh. Laubbaumarten
- Heiden
  - DB0 Feuchtheide
- Grünland, Brachen
  - EA1 Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthaferwiese)
  - yEC1b Feuchtwiese
  - EC2 Nass- und Feuchtwiese
  - EE3 Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland
  - EE3a Brachgefallenes Nassgrünland
  - EE3b Brachgefallenes Feuchtgrünland
- Gewässer
  - FF0 Teich
  - FN0 Graben
  - yFO1 Mittelgebirgsfluss
- landwirtschaftliche Nutzflächen
  - HA0 Acker
- Staudenfluren
  - LB1 Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft
  - LB2 Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft
- Moore, Sümpfe, Verlandungsbiotope
  - yCC2 Kalk-Kleinseggenried
  - zCC2 Kalk-Kleinseggenried
  - yCF2 Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten

- maßnahmenrelevante Arten
- |     |                         |                              |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| GK  | Geburtshelferkröte      | <i>Alytes obstetricans</i>   |
| LF  | Laubfrosch              | <i>Hyla arborea</i>          |
| EV  | Eisvogel                | <i>Alcedo atthis</i>         |
| MK  | Mühlkoppe               | <i>Cottus gobio</i>          |
| Ca  | Herbstzeitlose          | <i>Colchicum autumnale</i>   |
| Cp  | Sumpfdotterblume        | <i>Caltha palustris</i>      |
| Cpu | Floh-Segge              | <i>Carex pulicaris</i>       |
| Dm  | Breitblätt. Knabenkraut | <i>Dactylorhiza majalis</i>  |
| Dr  | Rundblätt. Sonnentau    | <i>Drosera rotundifolia</i>  |
| El  | Breitblätt. Wollgras    | <i>Eriophorum latifolium</i> |
| Ep  | Sumpf-Stendelwurz       | <i>Epipactis palustris</i>   |
| Et  | Glockenheide            | <i>Erica tetralix</i>        |
| Gc  | Mücken-Händelwurz       | <i>Gymnadenia conopsea</i>   |
| Gr  | Bach-Nelkenwurz         | <i>Geum rivale</i>           |
| Pp  | Sumpf-Herzblatt         | <i>Parnassia palustris</i>   |
| Sc  | Kümmel-Silge            | <i>Selinum carvifolia</i>    |
| Sp  | Teufelsabbiss           | <i>Succisa pratensis</i>     |
| Tp  | Sumpf-Dreizack          | <i>Triglochin palustre</i>   |

- Grenze FFH-Gebiet
- Grenze NSG
- §62 Biotop
- FFH-Lebensraumtyp

#### Beeinträchtigungen

- 0.0 großes Signalkrebs-Vorkommen
- 0.1 Verschlammung der Kiesbänke, Entwertung als Laichplatz
- 1.10 Ausbreitung Neophyten (Indisches Springkraut, Japanischer Staudenknöterich)
- 1.18 unerwünschte Sukzession
- 7.14 Gewässerunterhaltung zu intensiv: regelmäßiges Entfernen von Tot- und Altholz
- 7.31 Wasserstandsabsenkung

#### Maßnahmenkonzept Satzer Moor DE-4220-301

##### Bestandskarte

Bearbeitung: Be /Gr  
Kartographie: Ti

Stand: 20.09.2010  
Maßstab: 1:2000 in A3

Landschaftsstation  
im Kreis Höxter e.V.



Zur Specke 4  
34434 Borgentreich